

評価のポイント

CL-3.看護実践能力：ケアする力 [28-3] 薬剤の副作用と生体反応の早期発見

1. 糖尿病治療薬のリスクについて考えてみましょう。

副作用には低血糖がある。

血糖値70mg/dL以下

- ・空腹感
- ・脱力感
- ・冷や汗
- ・手や足の震え
- ・動悸
- ・イライラ感

血糖値50mg/dL以下

- ・頭痛
- ・吐き気
- ・目のかすみ
- ・集中力の低下
- ・取り乱す

血糖値30mg/dL以下

- ・意識障害
- ・けいれん
- ・昏睡
- ・死亡

2. 手術前、周術期に中止する薬剤にはどのようなものがありますか？

分類	薬剤	中止理由
抗血小板薬	プラスグレル、チカグレロル、アスピリン、イコサペント酸エチルなど	止血困難
抗凝固薬	ワルファリン、DOACなど	止血困難
女性ホルモン薬	経口避妊薬（ピル）など	血栓症
降圧薬	ACE阻害薬、ARB	術中低血圧
糖尿病治療薬①	ビグアナイド系薬	乳酸アシドーシス
糖尿病治療薬②	SGLT 2 阻害薬	ケトアシドーシス
糖尿病治療薬③	他の血糖降下薬（SU剤など）	低血糖